


**«Методические рекомендации
по мерам безопасности при столкновении
с борщевиком Сосновского и оказанию
первой помощи»**



Борщевик Сосновского (*Heracleum sosnowskyi* Manden.) – крупное (до нескольких метров в высоту) травянистое растение семейства зонтичных (Apiaceae).

Разных видов борщевика в мире насчитывается 52 штуки. В России шире всего распространен борщевик Сосновского, и вот он как раз очень опасен.



Ожоги I-й и II-й степени развиваются на второй-третий день после контакта кожи человека с любой частью растений. В худшем случае развивается ожог III степени, представляющий угрозу для жизни. Зафиксированы случаи гибели людей и крупных животных, прикасавшихся к этому растению.

Выделяемые растением сильно пахнущие эфирные масла, попадая через дыхательные пути, вызывают аллергию и токсическое отравление.

Борщевик обладает высокой жизнеспособностью:

всходы переносят заморозки до минус -10°C , под глубоким снегом до минус $-35 - 45^{\circ}\text{C}$, а также устойчивы к высоким температурам до $+37^{\circ}\text{C}$.



Растение отличается быстрым ростом:

- **через две - три недели после начала весеннего отрастания его высота достигает 25 - 40 см;**
- **через 40 - 45 дней - более 1,5 м; длина листьев - до 1 м.**



- В зарослях борщевика ежегодно формируется и расходуется значительный запас семян - до 20 тысяч семян на 1 квадратный метр поверхности почвы.
- Размеры семян таковы, что если их уложить равномерно на поверхности почвы, то этого количества семян хватит чтобы покрыть 1 кв.м. полностью без промежутков.
- Большая часть семян всходит на следующий год после созревания.
- Борщевик распространяется семенами с помощью ветра, воды, животных, птиц, транспорта и другими средствами.




Борщевик способен образовывать заросли. После формирования такой заросли на занятую борщевиком территорию не могут проникнуть другие виды растений.

Борщевик в таких условиях может возобновляться неограниченно долгое время.



На подземной части побега борщевика, углубленной на 7-15 см в почву, формируется 5-6 почек, каждая из которых способна сформировать новый надземный побег, в случае гибели основного побега до наступления плодоношения.



- Для человека растение является ядовитым – способно вызывать ожоги.
- Все части растения в соке содержат фурукумарины – вещества, которые при попадании на кожу резко повышают ее чувствительность к ультрафиолетовому свету.
- Ожоги I-й и II-й степени развиваются на второй-третий день после контакта кожи человека с любой частью растения.



Как происходит ожог борщевиком?

Сок борщевика содержит в себе фурукумарин бергаптен. Это вещество увеличивает восприимчивость кожи человека к ультрафиолетовому излучению, то есть борщевик обладает фототоксичными свойствами. При этом сок борщевика не оказывает на кожные покровы явного раздражающего действия, непосредственно при контакте с растением человек не испытывает никакого дискомфорта. Но если в течение 48 часов после контакта кожа будет подвергнута воздействию солнечных лучей, это приведет к появлению сильного ожога.

Выраженность ожога будет тем больше, чем больше сока борщевика попало на кожу. Наиболее сильно выражено фототоксичное свойство у борщевика в период цветения. И, естественно, вероятность ожогов резко возрастает в ясные и солнечные дни.

Не менее распространена и аллергия на борщевик. В качестве аллергена выступают эфирные масла, которые и обуславливают пряный выраженный аромат цветка.

Симптомы ожога

Симптомы ожога борщевиком могут проявляться спустя довольно длительное время, иногда спустя несколько часов от момента контакта сока растения с кожными покровами. После того, как на пораженный участок кожи попадут солнечные лучи, он начинает сильно зудеть и краснеет. Чуть позже на нем образуются ожоговые волдыри. При многочисленных и сильных ожогах у пострадавших повышается температура тела, возникает головная и мышечная боль, появляются жалобы на резкую слабость, отсутствие аппетита. После того, как волдыри вскрываются, на их месте образуется эрозия, а затем длительно незаживающая язва. Со временем она эпителизируется, но на коже остаются темные пятна, сохраняющиеся несколько лет. Вдыхание эфирных масел, выделяемых борщевиком, также таит в себе опасность. Если длительное время находиться возле его зарослей, то возникает сильное головокружение, и может случиться глубокий обморок.

Первая помощь при ожоге борщевиком

Если произошел контакт кожных покровов с борщевиком, для профилактики ожога необходимо:

- 1. Промокните салфеткой или платком, не растирая и не применяя усилие. Старайтесь находиться в тени.**
- 2. Промойте пораженный участок мылом и смойте проточной водой**
- 3. Обработайте спиртом. Йод и бриллиантовый зелёный для этих целей не подходят!**
- 4. Укройте кожу от попадания солнечных лучей, во избежание сильного поражения. Не прибегайте к клейкому пластырю, тугим повязкам.**
- 5. Примите антигистаминное средство. Сок борщевика – сильный аллерген. Курс длится 5-6 дней.**
- 6. Исключено применение жирных кремов и мазей. Их использование способствует глубокому поражению кожи.**
- 7. Несколько суток не подвергайте кожу воздействию солнечных лучей**

Если ожог затронул глаза, рот или другие слизистые оболочки, к врачу обращаться нужно немедленно.





Берегите себя!

